



Risikovurdering af vinblade med restindhold af triadimefon

Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annika Boye

Publication date:
2023

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link back to DTU Orbit](#)

Citation (APA):
Jensen, B. H., & Petersen, A. B., (2023). *Risikovurdering af vinblade med restindhold af triadimefon*, No. 23/1007204, 1 p., May 16, 2023.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Risikovurdering af vinblade med restindhold af triadimefon

Forespørgsel

Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en sundhedsmæssig risikovurdering af et restindhold på 0,019 mg/kg af triadimefon i en prøve af vinblade. MRL er 0,01* mg/kg.

Konklusion

Det fundne indhold af triadimefon i vinblade vurderes at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko.

Vurdering

Triadimefon er ikke godkendt til anvendelse i EU. Der er i EU ikke fastsat toksikologiske referenceværdier for triadimefon. JMPR har i 2004 fastsat en ARfD på 0,08 mg/kg lgv. DTU Fødevareinstituttet vurderer, at ARfD på 0,08 mg/kg lgv kan bruges i det konkrete fund af triadimefon i vinblade.

Den akutte eksponering beregnes til henholdsvis 0,0057 µg/kg lgv. og 0,017 µg/kg lgv. for børn og voksne, hvis EFSA PRIMo vers. 3.1 bruges til beregningen. I EFSA PRIMo version 3.1 er det et tysk barn og en tysk voksen, der er de kritiske forbrugere i EU. Eksponeringen vil være mindre for danske forbrugere.

De beregnede eksponeringer svarer til henholdsvis 0,01% og 0,02% af ARfD for børn og voksne.

Konklusion: Det fundne indhold af triadimefon i vinblade vurderes at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko.

Bodil Hamborg Jensen og Annika Boye Petersen